TZAR-05 Ltd.
www.veterinarna-apteka.com

# *ЛИНИЯ ДОПЪЛВАЩИ ФУРАЖИ*


***За всички видове животни, птици, декоративни птици и гризачи***

**tel.: 0877908513, 0888218847, e-mail: vetsklad@mail.bg**

TZAR-05 Ltd.
www.veterinarna-apteka.com

# IMMUNOBETA

## ДОПЪЛВАЩ ФУРАЖ, СЪДЪРЖАЩ ФУРАЖНИ ДОБАВКИ




***Естественият избор за добро чревно здраве и отлични икономически резултати***

**Състав:**

***1,3-1,6 Бета-Глюкани 30 %***

***Маннанолигозахариди 25 %***

***Нуклеотиди 7%***

*Вит. $B_1$,Вит $B_2$, Вит $B_6$, Ниацин, Пантотенова киселина, Фолиева киселина, Холин, Желязо,Цинк, Манган, Мед*

***Доза и начин на употреба:***

***IMMUNOBETA*** *е имуностимулатор и пребиотик предназначен за всички видове и категории животни и птици. Прилага се добре размесена с храната.*

***Млечни крави***: *20-30 гр/ глава/ден* ***(3-5 кг/тон фураж)***
***Телета***: *10-15 гр/глава/ден* ***(4-5 кг/тон фураж)***
***Овце и кози***: *4-6 г /глава/ден* ***(2-5 кг/тон фураж)***
***Агнета и ярета:*** *8гр/глава/ден* ***(4-5 кг/тон фураж)***
***Коне:*** *30 гр/глава/ден* ***(4-6 кг/тон фураж)***
***Свине:*** *-отбиване* ***2.0-4.0 кг./тон***
*-подрастване* ***2.0-4.0 кг./тон***
*-угояване* ***1.0-2.0 кг./тон***
*-свине майки* ***2.0-4.0 кг./тон***
***Патици за гушене***:*-подрастване* ***2.0–4.0 кг./тон***
*-угояване* ***2.0–4.0 кг./тон***
*-гушене* ***2.0 кг./тон***
***Кокошки носачки:*** *-стокови* ***2.0-4.0 кг./тон***
*-родителски стада* ***2.0-4.0 кг./тон***
***Бройлери***: *-подрастване (0-14 ден)* ***2.0-4.0 кг./тон***
*- угояване* ***2.0 кг/ тон***
*- финишър* ***1.0 кг/ тон***
***Пуйки:*** *- подрастване (0-3 седмица)* ***3.0 кг/тон***
*- угояване (4-8 седмица)* ***2.0 кг/тон***
*-финишър (9-12 седмица)* ***1.0 кг/тон***
*-финишър (13 седмица )* ***1.0 кг/тон***

***Зайци:*** ***2.0-4.0 кг./тон***
***Риба:*** ***2.0-4.0 кг./тон***
***Декоративни птици: 1.0 -2.0 кг./тон***
***Кучета:*** ***3-5 гр./ден***
***Котки:*** ***2.0 гр./ден***

tel.: 0877908513, 0888218847, e-mail: vetsklad@mail.bg

***Хранителна стойност:***

***IMMUNOBETA*** *е имуностимулатор и пребиотик, получен от подбрани щамове дрожди (Saccharomyces cerevisiae) чрез процес на ензимна автолиза .Основните компоненти* на ***IMMUNOBETA*** *са подрани, дозирани и стабилизирани съобразно хранителните изисквания на животните и птиците и изискванията на фуражопроизводството.* ***IMMUNOBETA*** *за разлика от други продукти извлечени от неактивирани дрожди съдържа трите важни компонента, а те са активните съставки:*

***β-glucans 30%***
***mannanoligosaccharides 25%***
***nucleotides 7%***

***IMMUNOBETA*** *чрез β-глюканите стимулира неспецифичната имунна реакция на организма и локалния чревен имунитет и по този начин намалява риска от поява на стомашно-чревни и инфекциозни заболявания.* ***Стопира напълно проблемите породени от условно-патогенни E.coli , Clostridium spp. и Salmonella spp .*** *Чрез съдържанието на мананолигозахариди* ***, IMMUNOBETA*** *стимулира развитието на чашковидните клетки и чревните власинки.Тези клетки отделят слуз, която пречи на патогенните микроорганизми да се прилепват към чревната лигавица.Регулира чревната микрофлора , стимулирайки развитието на полезни бактерии в червата и цялостното развитие на чревната тъкан,което води до пълноценно усвояване на фуража . Маннанолигозахаридите в* ***IMMUNOBETA*** *играят свързваща роля срещу микотоксините, особено* ***алфатоксин и зеараленон .***
*Чрез нуклеотидите,* ***IMMUNOBETA*** *стимулира растежа и увеличават броя на чревните власинки като ги сгъстяват, това води до отделяне на голямо количество слуз, която стопира резорбцията на микотоксините и прикрепването на патогенни бактерии към чревната стена. Развиват се жлезистите клетки в червата – оптимално усвояване на фуража.Нуклеотидите представляват ключови хранителни вещества за тъкани с голям индекс на клетъчно делене като чревната лигавица и имунната система.*
*При влагане на* ***IMMUNOBETA*** *във фуража на всички категории животни и птици продуктивните параметри ще се подобрят благодарение на по-доброто развитие на чревната лигавица и имунната система.*
***IMMUNOBETA премахва стресът и забавения растеж при животните и птиците.*** *Подобрява храносмилателните процеси и се препоръчва в ранните етапи на растежа като отбиване, ваксинации , пронасяне , прехвърляне от една група в друга и други форми на стрес. Оптимизира резултатите във фермите.Стимулира имунната система. Поддържа здравния статус на чревната флора* ***. IMMUNOBETA*** *е превантивна хранителна мярка за намаляване и изключване на употребата на антибиотици, алтернатива на нутритивните антибиотици като стимулатор на растежа, повишава се смилаемостта и усвояването на фуража чрез стимулиране активността и функционалния капацитет на чревната тъкан*

*При* ***прасета****, включването на* ***IMMUNOBETA*** *в периода от захранването(3-5 ден след раждане), преди и след отбиването , до 25 килограма в доза 2.0- 4.0 кг./тон фураж, предотвратява появата на Coli-диарии,Clostridium spp.-инфекции,салмонелози и блокира вредното влияние на микотоксините, ограничава се и отпада нуждата от употреба на антибиотици.Препоръчително е добавянето на* ***IMMUNOBETA*** *към фуража във всички случаи на стрес,особено при формирането на новите групи за угояване. Добавяне на*

***IMMUNOBETA*** *към смеските води до съкращаване на периода на използване на цинков окис,също и до намаляване на процента на влагането му във фуража, до пълното му изключване . Оптимизира съотношението използван фураж / прираст. При плановите ваксинации (срещу микоплазми[APP],цирковирусни инфекции,PRRS-синдром и др.) на прасенцата* ***IMMUNOBETA*** *осигурява силен и дълготраен имунитет при 88 – 90% от животните.*

*При* ***свине майки****, прилагането на* ***IMMUNOBETA*** *в доза 2.0 -4.0 кг./тон фураж,включена преди,по време и след опрасване води до запазване на апетита на майките, овладява стреса, стимулира имунната система ( намалява риска от MMA-синдром), увеличава количеството на млякото и количеството на* ***имуноглобулин А*** *(Ig A) в колострата и млякото. Стимулира и подкрепя детоксичната функция на черния дроб .*

*При* ***кокошки носачки*** ***IMMUNOBETA*** *стимулира неспецифичния имунен отговор на организма.* ***IMMUNOBETA*** *намалява рискът от поява на стомашно – чревни и инфекциозни заболявания и общото състояние на птиците се подобрява. По този начин* ***IMMUNOBETA*** *премахва проблемите, свързани с E. coli, клостридии , салмонели, пастьорели и кокцидиози.Най-често Колиинфекциите и кокцидиозите се проявяват в периода около пронасянето,но при включване на* Immunobeta *в периода от 16 до 25 седмица заболеваемост липсва и се осигурява бързо повишаване на носливостта.Ефектите от прилагането на* ***IMMUNOBETA*** *при кокошките са - 0 % смъртност – не се провокират условнопатогенни инфекции и кокцидиози; бързо повишаване и задържане на %-та носливост до 97 % на 25 ден от пронасянето (1-виден-19 %; 10-виден-69%;14-тиден – 88 % ); намаляване на разходите – не се налага употреба на антибиотици и кокцидиостатици;висококачествени яйца без остатъчни количества на лекарствени препарати;при родителски стада се подобрява люпимоста на яйцата и устойчивостта на новоизлюпените пилета поради повишеното отделяне на лизоцим; предотвратяват се проблеми свързани с мастна дегенерация на черния дроб и микотоксикози.*

*При* ***пилета бройлери*** *размесването на* ***IMMUNOBETA*** *с фуража предотвратява стреса от транспорт, настаняване, ваксинации; стопира се проявата на условнопатогенни инфекции предизвикани от ентеробактерии като* ***E.coli*** *и* ***Clostridium perfringens*** *(ниво на смъртност/мокра постеля);смъртността се свежда до санитарния минимум; изравняване на стадото-изравнен растеж на пилетата в помещениета;скъсяване на периода за угояване на 35-37 дни;отлична конверсия на фуража и редуциране на феномена малабсорбция и непоносимост към храна;* ***намаляване на разходите поради намалената употреба и дори отпадането на антибиотиците****.*

*При* ***патици за гушене*** *размесването на* ***IMMUNOBETA*** *с фуража стопира се проявата на условнопатогенни инфекции предизвикани от ентеробактерии като* ***E.coli*** *и* ***Clostridium perfringens****;блокира резорбцията на микотоксини от фуража;отлично развитие на гушата и храносмилателната система(ограничава се риска от разкъсванията на гушата); по висок прираст и съкращаване на периода на угояване; изравняване на стадата с отлично телесно състояние на патиците; намаляване на смъртността до 1 – 4 %; чиста и качествена продукция, поради изключването на антибиотиците;* ***качествен черен дроб – получава се гладка структура на черния дроб и се запазва здравината, целостта и компактността на капсулата му – това гарантира отличен търговски вид***

*При* ***конете*** ***IMMUNOBETA*** *стимулира неспецифичната имунна защита; поддържа здравословна чревна микрофлора, която е важна имунна бариера срещу условнопатогенните бактерии.Конкретно бета-глюканите съдържащи се в* ***IMMUNOBETA*** *стимулират растежа на бифидобактериите и лактобацилите, чиято ферментация, в дебелото и в сляпото черво произвежда късоверижни мастни киселини, които стимулират растежа на ентероцитите на чревните въси.****Благодарение своите характеристики, IMMUNOBETA може да се дефинира като продукт против колики при конете.*** *Коликите са в резултат на грешки и резки промени в храненето по време на смяна на сезона; газоите колики се причиняват от хипер ферментация на храни в дебелото черво и в цекума.С прилагането на* ***IMMUNOBETA*** *се предотвратяват причините за тези нарушения в чревния метаболизъм.Обстипацията на червата се причинява от недостатъчното потребление на вода, повишено изпотяване при свръхнатоварване, като бета-глюканите в* ***IMMUNOBETA*** *поемат големи количества вода като увеличават обема на изпражненията и по този начин улесняват чревния транзит (стимулират се перисталтичните движения).По този начин* ***IMMUNOBETA*** *предотвратява колките като една от водещите причини за високата смъртност прив спортните коне.Индиректно чрез регулиране на чревната функция* ***IMMUNOBETA*** *премахва една от причините за поява на пододерматит(ламинит).*

*При* ***едри*** *и* ***дребни преживни*** *в период на лактация в доза 3.0 кг/тон фураж , след 10 – 15 дневно размесване на* ***IMMUNOBETA*** *с фуража се постига повишаване на дневния млеконадой със средно 100 литра на ден(повишение от 500 мл до 2 литра на ден на глава при ЕПЖ) в зависимост от броя на животните във фермата.Стимулира и подкрепя детоксичната функция на черния дроб , мотриката и флората на предстомашията. Повишава нивата на* ***имуноглобулин А*** *(Ig A) ) в колострата и млякото. Нормализира pH-то в търбуха, което води до по-малко* ***ацидози*** *и се намалява риска от* ***кетоза.*** *IMMUNOBETA недопуска преминаването на микотоксините през чревната стена и натрупването им в черния дроб и преминаването им в млякото. IMMUNOBETA засилва имунитета на кравите,овцете и козите поради съдържанието на бетаглюкани – 30%, което стимулира неспецифичната имунна реакция и спомага за изграждането на стабилен имунитет при провеждането на ваксинации.*
*При* ***телета, агнета и ярета*** *, размесването на* ***IMMUNOBETA*** *с фуража предотвратява появата на коли-диарии,анаеробна дизентерия при агнета(CL.perfringens тип А); развива чревната флора ,подобрява усвояването на фуража и прираста.*

*При* ***зайци*** *размесването на* ***IMMUNOBETA*** *с фуража, отстранява проблемите предизвикани от ентеробактерии като* ***E.coli*** *и* ***Clostridium perfringens*** *и кокцидиози .Укрепва имунната система развива чревната флора , подобрява усвояването на фуража и угояването.* ***IMMUNOBETA****, предотвратява стреса при отбиването най – често проявяващ се с подуване.*

***Карентен период :*** *няма*

***Опаковка:*** *чували 20 кг.*

***Срок на годност :*** *до срокът, обозначен на опаковката*

***Съхранение:*** *в тъмни помещения при температура под 25 градуса*

***След употреба не замърсявайте околната среда***

TZAR-05 Ltd.
www.veterinarna-apteka.com

# METAFISIOL




## ДОПЪЛВАЩ ФУРАЖ, СЪДЪРЖАЩ ФУРАЖНИ ДОБАВКИ

**Хепатопротектор , метаболитен и физиологичен активатор.**

***Състав:***

***L-карнитин, DL-метионин,L- лизин, L- глицин, L- цитрулин,L- аспаргинова киселина, L- орнитин, L- глутаминова киселина, L-аргинин, Витамин B12, Витамин B6, Никотинамид, Калциев пантотенат, Сорбитол***

***Доза и начин на употреба:***

**METAFISIOL** *е предназначен за всички видове и категории животни и птици.Прилага се добре разтворен във водата за пиене.*

| | |
|---|---|
| ***Кокошки носачки*** | ***200 мл. / 100 л. вода*** |
| ***Патици за гушене*** | ***200 мл / 100 л. вода*** |
| ***Пилета-бройлери*** | ***200 мл / 100 л. вода*** |
| ***Зайци:*** | ***200 -300 мл / 100 л. вода*** |
| ***Свине и прасета:*** | ***100 - 200 мл / 100 л. вода*** |
| ***Едри преживни, телета :*** | ***50 мл /глава/ на ден*** |
| ***Дребни преживни :*** | ***10 мл /глава/ на ден*** |
| ***Коне:*** | ***50 мл /глава/ на ден*** |
| ***Котки:*** | ***3 мл /ден*** |
| ***Кучета:*** | ***5 – 12 мл./ден*** |
| ***Декоративни птици и гризачи:*** | ***3 - 4 мл/1 л. вода*** |

***Продължителност на третиране : 7 -10 дни***

***Хранителна стойност:***

*Благодарение на уникалната си новаторска формула,* **METAFISIOL** *способства пречистването на организма от амоняк ,детоксикацията,антистеатозата,стимулира отделянето на жлъчка и обмяната на енергия.Подобрява снабдяването на клетките с кислород.* **METAFISIOL** *е необходим в условия на интензивно производство и във всички случаи на стрес, интоксикации, при възстановяване след тежки заболявания и ваксинации при животните, за тонизиране на организма и възстановяване на енергийния баланс след големи натоварвания при животни за спорт и лов.*

tel.: 0877908513, 0888218847, e-mail: vetsklad@mail.bg

***METAFISIOL*** *има пряко действие върху метаболизма на черния дроб и организма като цяло, поради специфичното съдържание на точно определена комбинация от витамини и аминокиселини.* ***METAFISIOL*** *оказва следния благоприятен ефект върху организма:*

☆ *Антистеатозно и хепатопротективно действие, дължащо се на* ***L-карнитин,L-лизин и DL-метионин.*** *L-карнитин участва в преноса на мастните киселини до митохондриите ,където те изгарят с отделяне на енергия,а също и в обезвреждането на продуктите от обмяната им.Така се възпрепятства образуването на кетонови тела.Лизина е важен за различни метаболитни процеси в организма,а заедно с метионина стартират ендогенния синтез на L-карнитин в черния дроб и бъбреците.Метионина е фундаментален за процесите на синтез и детоксикация протичащи в черния дроб.*

☆ *Подпомага черния дроб при обезвреждането на амоняка,чрез* ***L-орнтин, L-цитрулин , L-аргинин, L-аспаргинова киселина, L-глутаминова киселина.****Тези аминокиселини участват в процесите на превръщането на амоняка в пикочна киселина ,която се отделя през бъбреците, като краен продукт от обмяната на белтъците.*

☆ *Стимулира отделянето на жлъчка ,чрез* ***L-глицин***

☆ *Доставя енергия чрез съдържанието на* ***сорбитол***

☆ *Източник на витамини от група В –* ***$B_6$,$B_{12}$,PP,Пантотенова киселина***

*При* ***кокошки носачки*** *,ежемесечното прилагане на* ***METAFISIOL*** *за 5-7 дни в доза 2-3 литра/тон вода ( в комбинация с* ***PANTOSAL NEW*** *1л / 2 тона вода ),балансира недостига на аминокиселини във фуража и повишава и задържа носливостта на високи нива.* ***METAFISIOL*** *предотвратява метаболитни смущения свързани с черния дроб* ***(синдром на мастния черен дроб, синдром на внезапната смърт, синдром на хеморагичен мастен черен дроб при носачки).***

*При* ***бройлери*** *и* ***патици за гушене*** *прилагането на* ***METAFISIOL*** *в деня на излюпване в доза 3 л. / тон вода подпомага бързата и пълна резорбция на остатъчния жълтък , доставя необходимата енергия, създава условия за развитието на полезната чревна флора.В последствие прилагането на* ***METAFISIOL*** *продължава от 1-я до 5-я в доза 2л. / тон вода ,което* ***изключва използването на антибиотици****.В същата доза* ***METAFISIOL*** *е необходимо да се прилага и след ваксинации на птиците , тъй като стимулира изграждането на силен и дълготраен имунитет.* ***METAFISIOL*** *предотвратява хранителния стрес при смяна на вида на смесите и при промяна в компонентите им, което дава възможност за плавна промяна в храненето.*

*При* ***зайци*** *, прилагането на* ***METAFISIOL*** *в периода на захранване в доза 2- 3 л./тон вода за 10 дни стимулира развитието на полезната чревна флора, което в по късен намалява риска от поява на основния проблем при тях –бактериални заболявания от страна на храносмилателната система (Тайзер, Ентеро- токсемия, Колибактериоза).* ***METAFISIOL*** *е особено необходим през периода на интензивното развитие на дебелите и слепи черва (тук протича разграждането на целулозата от бактериални ензими), който започва от захранването на зайците с фуражи до 50 – 60 дневна възраст.В този период* ***METAFISIOL*** *може да се прилага постоянно в доза 2 л./тон вода.* ***METAFISIOL*** *се препоръчва в същата доза за период от 7 дни след ваксинации, тъй като стимулира имунната система към изграждане на силен и дълготраен имунитет.*

*При **<u>коне</u> и <u>ловни кучета</u>** , **<u>METAFISIOL</u>** се прилага след големи натоварвания ,с цел тонизиране на организма и възстановяване на енергийния баланс.*

***Карентен период :** няма*

***Опаковка:** туба 10 л. ; бутилка 1 л.*

***Срок на годност :** до срокът, обозначен на опаковката*

***Съхранение:** в тъмни помещения при температура под 25 градуса*

***След употреба не замърсявайте околната среда***

# TZAR-05 Ltd.

www.veterinarna-apteka.com




# SELENE

## ДОПЪЛВАЩ ФУРАЖ, СЪДЪРЖАЩ ФУРАЖНИ ДОБАВКИ

***Уникална новаторска формула за лекуване и профилактика на мускулна дистрофия и мощен антиоксидант***

***Състав:***

***Селен, Витамин $D_3$, Витамин Е, Витамин $B_{12}$, Инозитол***

***Доза и начин на употреба:***

**SELENE** *е предназначен за всички видове и категории птици, овце, кози, агнета, ярета, коне. Прилага се добре разтворен във водата за пиене в следните дози:*

***Птици:*** ***50-100 мл / 100 л. вода***

***Агнета,ярета:*** ***100- 200 мл /100 л. вода***

***Овце, кози :*** ***100- 200 мл /100 л. вода***

***Декоративни птици и гризачи: 50 - 100 мл/100 л. вода***

***Продължителност на третиране : 5 - 7 дни***

***Хранителна стойност :***

**SELENE** *се прилага във всички случаи на недостиг на селен и витамин Е.Освен наличието на биологичен селен, присъствието в състава му на витамини от група В ($B_{12}$, Инозитол [$B_8$]) , $D_3$ и Е, правят* **SELENE** *мощен антиоксидант и препарат тонизиращ целия организъм .*

*Микроелемента* **селен** *действа като антиоксидант, срещу мускулна дистрофия, енцефаломалация, забавен растеж, поддържа активна имунната система и активира енергийния обмен. Най-важната функция на* **селен** *– участва в състава на ензима глутатион пероксидаза, който предпазва клетките от опасните свободни радикали образуващи се при обмяната на веществата.Защитава мастните киселини преди окислението.При преживните нуждите от селен са по високи, тъй като се усвоява трудно поради образуването на трудноусвоими съединения в предстомашията.*

tel.: 0877908513, 0888218847, e-mail: vetsklad@mail.bg

***Инозитола ( вит. $B_8$)*** *подпомага процесите на детоксикация в организма и по този начин осъществява хепатопротективно действие; улеснява метаболизма на мастните киселини , предотвратявайки стеатоза на черния дроб. Инозитола е част от системата активираща клетъчните процеси,в отговор на стрес фактори на средата ; благоприятства действието на серотонина и невромедиаторите , което подържа нервната система в добро функционално състояние(антистресов ефект).Инозитола регулира двигателната активност на стомаха.* ***Вит. $B_{12}$*** *подобрява апетита, подпомага растежа, спомага за оползотворяването на мазнините, въглехидратите и белтъците от фуража.Той е основен елемент за правилното протичане на процесите на кръвообразуване.*

***Витамин Е*** *е мастно разтворим витамин, вътреклетъчен антиоксидант който стабилизира ненаситените мастни киселини като спира образуването на токсични липопероксиди Като антиоксидант той предпазва мембраните на клетките от натрупване на токсични продукти каквато е например млечната киселина. Участва в процеса на синтез на белтъците, растежа на клетките и доставянето на кислород до тях.Особено е необходим при даване с фуража на големи количества мазнини и за размножаването. В храносмилателната система предпазва вит.А от окисление и повишава резорбцията му.*

***Вит.$D_3$*** *регулира обмяната калций и фосфор в организма . Пуйките имат по-високи потребности от* ***вит. $D_3$*** *,тяхната скелетна структура и начина на угояване го изисква! За разлика от другите животни* ***вит. $D_3$*** *е 30 пъти по активен от вит.* ***$D_2$*** *при птиците.*

*При* ***птици*** *,* ***SELENE*** *е необходим за профилактика и лекуване на мускулна дистрофия, панкреатична некроза, енцефаломалация, уратна диатеза, ексудативна диатеза и хиповитаминоза Е.* ***SELENE*** *е необходим при нисък прираст (**бройлери, патици за гушене и пуйки**) и слаба продуктивност (**при стокови носачки и родителски стада в комбинацич с Pantosal New**).*

*При* ***агнета и ярета*** ***SELENE*** *е необходим за профилактика и лекуване на ензоотична мускулна дистрофия, хиповитаминоза Е, нисък прираст.*

*При* ***овце и кози*** ***SELENE*** *е особенно необходим по време на случната кампания,, тъй като приннедостиг на селен се наблюдава намалено либидо, нарушена овулация, което повишава процента на безплодие, а при новородените агнета и ярета се наблюдава повишена смъртност.*

***Карентен период :*** *няма*

***Опаковка:*** *туба 10 л. ; бутилка 1 л.*

***Срок на годност :*** *до срокът, обозначен на опаковката*

***Съхранение:*** *в тъмни помещения при температура под 25 градуса*

***След употреба не замърсявайте околната среда***




# PANTOSAL NEW

## ДОПЪЛВАЩ ФУРАЖ, СЪДЪРЖАЩ ФУРАЖНИ ДОБАВКИ

### За стимулиране метаболизма на минералните вещества

***Състав :***

***Калций, Фосфор, Манган, Цинк, Кобалт, Мед***

***Доза и начин на употреба:***

***PANTOSAL NEW*** *е предназначен за всички видове и категории животни.Прилага се добре разтворен във водата за пиене.*

| | |
|---|---|
| ***Птици:*** | ***50-100 мл / 100 л. вода*** |
| ***Зайци:*** | ***50-100 мл / 100 л. вода*** |
| ***Свине:*** | ***100-200 мл / 100 л. вода*** |
| ***Едри преживни,телета :*** | ***50 мл /глава/ на ден*** |
| ***Дребни преживни :*** | ***10 мл /глава/ на ден*** |
| ***Коне:*** | ***50 мл /глава/ на ден*** |
| ***Декоративни птици и гризачи:*** | ***100 мл/100 л. вода*** |

***Продължителност на третиране :*** *5 - 7 дни ; третирането се повтаря след една седмица при необходимост.*

***Хранителна стойност :***

***PANTOSAL NEW*** *се състои от макро - и микроелементи (биокатализатори) , като се прилага за подобряване на метаболитните процеси и по-добра продуктивност.* ***PANTOSAL NEW*** *е източник на фосфор, калций и микроелементи в лесноусвоима форма .* ***Калция( Ca )*** *заедно с фосфора участва в минерализацията и в строежа на костите и зъбите ; участва и в обмяната на другите минерални вещества ( магнезий , фосфор,натрий,цинк , манган); играе важна роля в активизирането на ензими и хормони и в процеса на кръвосъсирване.Заедно с останалите електролити регулира нервно – мускулната дразнимост и мускулните контракции.Освен в изграждането на костите и зъбите* ***фосфора*** *е необходим при обмяна та на въглехидратите и разграждане на метаболитите на белтъците и мазнините.* ***PANTOSAL NEW*** *е с балансирано съдържание на* ***калций*** *и* ***фосфор****, което предразполага за пълното усвояване на* ***цинка****.* ***PANTOSAL NEW*** *е балансиран в съотношението* ***мед/цинк*** *(1 : 2),което е необходимо за поддържането на оптималната концентрация на цинка в организма (****излишъка от мед понижава нивата на цинка****).* ***Цинка*** *влиза в структурата и е кофактор на различни ензими,особено е необходим за млади животни и птици и за правилно протичане на сперматогенезата при мъжки животни. Микроелемента* ***мед*** *е важен за усвояването на вит.C , абсорбцията на желязото и трансформацията на тъканното желязо в хемоглобин.* ***PANTOSAL NEW*** *съдържа оптимално количество и от микроелемента* ***манган****,който е важен за синтеза на тироксин от щитовидната жлеза*

*и така осигурява правилното усвояване на биотин(вит.Н), вит. $B_1$ и вит. С.**Мангана** има отношение към пълноценното смилане и усвояване на храната,тъй като е катализатор за ензимите участващи в този процес.Недостига на манган води до увреждане на малкия мозък и нервите , което се проявява с атаксия.Особено чувствителни към недостиг на **манган** са птиците порадиди по трудното усвояване, което води до деформации в скелета, пероза.При **стокови носачки** се влошава качеството на черупката и намалява дебелината й, а при **родителски стада** намалява броя и люпимоста на яйцата. **PANTOSAL NEW** съдържа оптимално количество **кобалт** , който е необходим, защото недостига му довежда до допълнително намаляване на резорбцията на калция и фосфора, така необходими по отношение здравината на черупката и носливостта при кокошките носачки.Недостига на **кобалт** води до анемия, забавяне на растежа и загуба на тегло.*

*При **бройлери и патици за гушене** **PANTOSAL NEW** се прилага 5 – 10 ден и 20 – 25 ден в доза 1 литър на 2 тона вода (в комбинация със **SELENE** също 1 л./ 2тона вода) за правилна минерализация на скелета , активен растеж на костите съразмерно с мускулната тъкан и намаляване на мускулната умора.При **патици за гушене** в периода 20 – 30 ден от излюпването **PANTOSAL NEW** е източник на лесноусвоими микроелементи , тъй като те имат високи потребности от тях.*

*При **кокошки носачки** ежемесечното прилагане на **PANTOSAL NEW** за 5-7 дни в доза1 литър на 2 тона вода ( в комбинация с **METAFISIOL** 2-3 литра/тон вода), балансира недостига на макро – и микроелементи, увеличава и задържа носливостта на максимално ниво и заздравява черупката на яйцата.*

*При **свине и прасета** **PANTOSAL NEW** е източник на лесноусвоим калций , фосфор и микро - елементи , включително и **цинк**.Прилагането на **PANTOSAL NEW** с водата в доза 100-200 мл/100 литра вода , ефективно замества токсичния цинковият окис във фуража тъй като е източник на достатъчно количество цинк необходим за израстването на прасетата и предотвратява появата на паракератоза.*

*При **едри преживни** **PANTOSAL NEW,** приложен в доза 50 мл /глава/ на ден за 3 -5 дни преди и след отелване, предотвратява появата на следродилна пареза; източник е на фосфор,който е много необходим за размножаването и развитието на стомашната флора.При **телета, агнета, ярета** прилагането **PANTOSAL NEW** още в ранна възраст с млякото , млекозаместител или водата за пиене, предотвратява появата на рахит и недоимъчни заболявания свързани с липсата микроелементи,особено на манган.*

***Карентен период :** няма*

***Опаковка:** туба 5 литра*

***Срок на годност :** до срокът, обозначен на опаковката*

***Съхранение:** в тъмни помещения при температура под 25 градуса*

***След употреба не замърсявайте околната среда***




# ANPROSOL AMINOPAN

***ДОПЪЛВАЩ ФУРАЖ,***
***СЪДЪРЖАЩ ФУРАЖНИ ДОБАВКИ***

***Източник на всички витамини и незаменими аминокиселини***

***Състав :***

***Витамин А, Витамин $D_3$, Витамин Е, Витамин $K_3$, Витамин Н, Витамин $B_{12}$, Витамин $B_1$, Витамин $B_2$, Витамин $B_6$ , Холинхлорид, D-пантотенова киселина***

***L-триптофан, L- лизин, DL- метионин, L- хидроксипролин, L-аланин, L-цистеин, L-хистидин, L- валин, L-аргинин, L-изолевцин, L- аспаргинова киселина, L-левцин, L-треонин, L-тирозин, L-серин, L-фенилаланин, L- глутаминова киселина, L-глицин, L-пролин***

***Доза и начин на употреба:***

**ANPROSOL AMINOPAN** *е предназначен за всички видове и категории животни, птици и пчели. Прилага се добре разтворен във водата за пиене.*

***Разрежда се в доза 50 мл на 100 литра вода (1 литър на 2 тона вода).***

***Пчелни семейства : 10 – 15 мл. На 1 литър захарен сироп или 1 кг медно-захарно тесто***

***Продължителност на третиране :*** *5 - 7 дни* ***;*** *третирането се повтаря след една седмица при необходимост.*

***Хранителна стойност :***

*Поради балансираното съдържание на всички основните групи витамини и аминокиселини,* **ANPROSOL AMINOPAN** *се препоръчва във всички случаи на стрес , ваксинации, изтощаване на организма ,за профилактика и лекуване на авитаминози ,по време и след терапевтично лекуване,за възстановяване на чревната флора и за висока продуктивност.* ***Витамин А*** *се включва в процеса на формиране и запазване на функция на епителните тъкани и лигавиците ;важен е за плодовитостта на животните и е от съществено значение за зрението.* ***Витамин D3*** *регулира и коригира калциевия и фосфорен метаболизъм в кръвта и играе важна роля в усвояването на калция и фосфора в червата. Особено при младите, растящи животни витамин D3 е от съществено значение за нормалното развитие на скелета и зъбите.* ***Витамин Е*** *е мастно разтворим вътреклетъчен антиоксидант, които участват в стабилизиране на ненаситените мастни киселини, като по този начин предотвратява образуването на токсични липопероксиди.Освен това, витамин Е предпазва кислородчувствителен витамин А от окислително разрушаване в този препарат. Съдържанието на* ***витаминте от група В*** *и аминокиселини в* **ANPROSOL AMINOPAN** *, подпомагат функциите на черния дроб,обмяната на мазнините. Високото съдържание на* ***холин*** *в*

***ANPROSOL AMINOPAN***, *гарантира приемането му в достатъчни количества с водата от птиците и животните,тъй като във фуражите* ***холина*** *е нестабилен.* ***Холина*** *осигурява бързото освобождаване на черния дроб от мастни киселини.* ***При недостиг на холин*** *внасян с храната, или при недостатъчната му биосинтеза в организма се забавя образуването на фосфолипиди в* ***черния дроб****, задържат се и се натрупват* ***мастни киселини****, вследствие на което се получава* ***чернодробна мастна дистрофия****.*
***Витамин К3*** *е необходим фактор за кръвната коагулация и също има значение за протеиновия метаболизъм; жизнено важен е за правилната работа на черния дроб, както и за усвояването на калция и отлагането му в костите.*

*При* ***кокошки носачки*** ***ANPROSOL AMINOPAN*** *чрез холина ,по естествен път води до по-добро оцветяване на жълтъка в яйцата.*

*При* ***патици за гушене*** ***ANPROSOL AMINOPAN*** *поради високото съдържание на вит.А, Д3, Е, В-комплекс и холин е необходим за подготовка на патиците за преминаване към гушенето.Тъй като патиците и особено Пекинската патица имат по високи нужди от холин,* ***ANPROSOL AMINOPAN*** *е решение като източник на напълно усвоим холин с водата за пиене.*

***Карентен период :*** *няма*

***Опаковка:*** *туба 10 литра ; бутилка 1 литър*

***Срок на годност :*** *до срокът, обозначен на опаковката*

***Съхранение:*** *в тъмни помещения при температура под 25 градуса*

***След употреба не замърсявайте околната среда***




# ANPROSOL $AD_3E$ + Ca

***ДОПЪЛВАЩ ФУРАЖ,***
***СЪДЪРЖАЩ ФУРАЖНИ ДОБАВКИ***

***За бързо възстановяване на калция в организма***

***Състав:***

***Витамин А, Витамин $D_3$, Витамин Е, Калциев глюконат***

***Доза и начин на употреба:***

**ANPROSOL $AD_3E$ + Ca** *е предназначен за всички видове и категории животни. Прилага се добре разтворен във водата за пиене в следните дози:*

***Птици:*** ***50 – 100 мл / 100 л. вода***
***Свине :*** ***50 – 100 мл / 100 л. вода***
***Едри преживни :*** ***150 мл / глава на ден***
***Дребни преживни :*** ***10 мл /глава на ден***
***Агнета, ярета:*** ***100 мл / 100 л. вода***
***Телета:*** ***50 мл / глава на ден***
***Зайци:*** ***50 – 100 мл / 100 л. вода***
***Декоративни птици и гризачи:*** ***1 мл / 1 л. вода***

***Продължителност на третиране :*** *5 - 7 дни ; третирането се повтаря след една седмица при необходимост.*

***Хранителна стойност :***

**ANPROSOL $AD_3E$ + Ca** *се прилага в случаи на костна калцификация, рахит, липса и чупливост на яйчните черупки и всички проблеми свързани с промяна на костната тъкан.* ***Витамин А*** *се включва в процеса на формиране и запазване на функция на епителните тъкани и лигавиците ;важен е за плодовитостта на животните и е от съществено значение за зрението.* ***Витамин D3*** *регулира и коригира калциевия и фосфорен метаболизъм в кръвта и играе важна роля в усвояването на калция и фосфора в червата. Особено при младите, растящи животни витамин D3 е от съществено значение за нормалното развитие на скелета и зъбите.* ***Витамин Е*** *е мастно разтворим вътреклетъчен антиоксидант, които участват в стабилизиране на ненаситените мастни киселини, като по този начин предотвратява образуването на токсични липопероксиди.Освен това, витамин Е предпазва кислород чувствителен витамин А от окислително разрушаване в този препарат.* ***Калция( Ca )*** *участва в минерализацията и в строежа на костите и зъбите ; участва и в обмяната на другите минерални вещества ( магнезий , фосфор,натрий,цинк , манган);*

tel.: 0877908513, 0888218847, e-mail: vetsklad@mail.bg

*играе важна роля в активизирането на ензими и хормони и в процеса на кръвосъсирване.Заедно с останалите електролити регулира нервно – мускулната дразнимост и в мускулните контракции.*

*При* ***кокошки носачки*** *и* ***родители*** *прилагането на* ***ANPROSOL AD$_3$E + Ca*** *в доза 50 мл на 100 литра вода за 5 -7 дни ,повишава носливостта и люпимоста на яйцата , и заздравява черупката на яйцата.*

*При* ***едри преживни*** *, прилагането на* ***ANPROSOL AD$_3$E + Ca*** *в доза150 мл /глава/ на ден за 2-3 дни преди и след отелване, предотвратява появата на следродилна пареза.При* ***телета,агнета,ярета*** *прилагането още в ранна възраст на* ***ANPROSOL AD$_3$E + Ca*** *с млякото , млекозаместител или водата за пиене, предотвратява появата на рахит и стимулира растежа.*

*При* ***бройлери и патици за гушене*** *,прилагането на* ***ANPROSOL AD$_3$E + Ca*** *в доза 50 мл на 100 литра вода предотвратява появата на рахит и осигурява нормално развитие на костите , съразмерно с бързо растящите мускули.*

***Карентен период :*** *няма*

***Опаковка:*** *туба 10 литра ; бутилка 1 литър*

***Срок на годност :*** *до срокът, обозначен на опаковката*

***Съхранение:*** *в тъмни помещения при температура под 25 градуса*

***След употреба не замърсявайте околната среда***

**TZAR-05 Ltd.**
www.veterinarna-apteka.com




# FITOMITE

***ДОПЪЛВАЩ ФУРАЖ,***

***СЪДЪРЖАЩ ФУРАЖНИ ДОБАВКИ***

## *За да контролирате на 100 % червеният акар /Dermanyssus gallinae/*

***Състав:***

***Натурални природни продукти в съдържание 30 мл/ л***
***Echinacea purpurea, Rosa canina, Tanacetum vulgare, Thymus vulgaris***
***Деминерализирана вода, Магнезиев Хлорид, Натриев хлорид.***

***FITOMITE*** *се прилага за контрол на опаразитяванията причинени от Dermanyssus galline (Кокошинки). Dermanyssus galline (Кокошинки) известен също и като „червен акар” при домашните и диви птици е кръвосмучещ акар, който е изключително широко разпространен в домашните и промишлени птицеферми, поради дългия им технологичен цикъл.* ***Пораженията от опаразитяването на птиците с Dermanyssus gallinae са огромни!***

**намалено яйценосене*
**Намалено тегло и клас на яйцата и промяна в цвета им*
**по- ниска цена и бракуване на яйца поради т.нар. „петнисти яйца”*
**повишена смъртност особено при млади птици, поради анемия и висока чувствителност към условно патогенни инфекции*
**висок здравен риск от заразяване с Coli spp., Salmonellaspp., Marek disease, Newcastle disease, холера на птици, вирусен енцефалит, птичи грип и др.*
**стрес, поява на извратен апетит и канибализъм*
***увеличен прием на фураж и по-ниско съотношение на конверсия на фуража при опаразитените птици*
**увеличаване на разходите за лекуване на птиците и за контрол на Dermanyssus gallinae*
**отрицателно влияние върху имунната реакция след ваксинация*
***лоши условия на труд и алергични реакции при обслужващия персонал*
**токсикологично влияние върху хората, дължащо се на остатъци (следи) от инсектициди в птичето месо и яйца.*

***Доза и начин на употреба:***

***FITOMITE*** *се прилага за предотвратяване и контрол на опаразитяването с* ***Dermanyssus galline (Кокошинки)*** *при кокошки носачки, пилета бройлери, патици и пуйки. Разтворете внимателно* ***FITOMITE*** *във водата за пиене.* ***FITOMITE*** *трябва да се прилага от втората седмица след пронасянето в доза* ***0.5 л.*** *на* ***1 тон*** *питейна вода, съответстващо приблизително на дневната консумация на вода от 5 000 кокошки носачки за* ***6*** *последователни дни.*

tel.: 0877908513, 0888218847, e-mail: vetsklad@mail.bg

***Схема на прилагане :***

***първо прилагане: 0.5 л. на 1тон вода*** *за 6 последователни дни*

***следващи третирания: 0.5 л./тон вода***
*след 15 дни - 1 ден*
*след 4 седмици - 1ден*
*след 4 седмици -1 ден*
*Повторете третирането на всеки 4 седмици за 1 ден до приключване на цикъла на производство.*

***Хранителна стойност :***

***FITOMITE*** *е базиран на естествени растителни екстракти, който правят кръвта на кокошките носачки несмилаема, така че Dermanyssus galline (Кокошинки) да не могат да усвояват кръвта с която се хранят и по този начин се спира тяхното размножаване /възпроизводство/.*

***Резултатите от прилагането на FITOMITE са:***

******* *Прилагането на* ***FITOMITE*** *във водата за пиене гарантира 100 % очистване тялото на птицата!*

**При прилагането на* ***FITOMITE*** *при птиците, Dermanyssus galline (Кокошинки) със сигурност го приемат чрез кръвта им!*

** Прилагането на* ***FITOMITE*** *при птиците не отнема допълнително време и персонал!*

** **БЕЗОПАСТНОСТ** -при прилагането на* ***FITOMITE*** *няма остатъчни количества в месото и яйцата!*

** При прилагането на* ***FITOMITE*** *във водата за пиене не се наблюдава стрес и канибализъм при птиците, несъществува здравен риск от заразяване с вирусни и бактериални инфекции!*

** Прилагането на* ***FITOMITE*** *гарантира отлично здраве, запазва високия % носливост с качествени и чисти яйца с ниска себестойност, поради запазване конверсията на фуража!*

** **FITOMITE** може да се използва във ферми със сертифицирано биологично производство!*

***Карентен период :*** *няма*

***Опаковка:*** *туба 5литра* ***;*** *бутилка 100 мл.*

***Срок на годност :*** *до срокът, обозначен на опаковката*

***Съхранение:*** *в тъмни помещения при температура под 25 градуса*

***След употреба не замърсявайте околната среда***

TZAR-05 Ltd.
www.veterinarna-apteka.com

# EQUUSNONI plus




***ДОПЪЛВАЩ ФУРАЖ, СЪДЪРЖАЩ ФУРАЖНИ ДОБАВКИ***

***Уникална новаторска формула за бързо възстановяване и физическа мощ***

***Състав :***

***Mochindra citrifolia ( сок от НОНИ ), глицин, метилсулфонилметан(МСМ), вит.Е, бетаин, L-карнитин, глюкозамин, хондроитин сулфат, масло от ленено семе***

***Доза и начин на употреба:***

***EQUUSNONI plus*** *е предназначен за всички категории коне.Прилага се добре размесен с фуража, водата за пиене или чрез директен прием в следните дози:*

***При отглеждане : 60 мл. два пъти дневно***

***По време на състезания: 120 мл. два пъти дневно***

***В случай на стресиращи състезателни условия: 240 мл. преди състезанието***

*Дозата на* ***EQUUSNONI plus*** *може да се увеличават след състезание за по-бързо възстановяване.*

***Хранителна стойност :***

***EQUUSNONI plus*** *е хранителна добавка за коне, съдържаща сок от НОНИ, богат на лесноусвоими антиоксиданти, витамини и аминокиселини.* ***EQUUSNONI plus*** *е с антиоксидантно действие и спомага за правилното храносмилане и усвояване на хранителните вещества, а също така и за* ***по-добър мускулен тонус*** *.* ***EQUUSNONI plus*** *съдържа* ***адптогени****, които имат* ***антистресов ефект.*** ***EQUUSNONI plus*** *като ежедневна част от дажбата на конете,* ***подобрява здравословното състояние, намалява времето за възстановяване*** *и подобрява концентрацията.Също така* ***повишава физическата работоспособност*** *при продължителни тренировки и състезания.Съдържащите се в* ***EQUUSNONI plus*** *незаменими мастни киселини подобряват* ***блясъка на космената покривка.*** ***EQUUSNONI plus*** ***поддържа ставите и сухожилията здрави*** *тъй като съдържа глюкозамин, хондроитин и метилсулфонилметан (МСМ),които са основни хондрозащитни средства в течна форма.* ***Метилсулфонилметанът ( МСМ )*** *е естествен източник на органична сяра, действа главно като силен антиоксидант, предпазва хрущялните и костни клетки и тъкани. Без достатъчно органична сяра, каквато е във състава на МСМ, клетките и телесните структури губят своята еластичност и гъвкавост. МСМ се използва, за да увеличи издръжливостта им и да минимизира мускулната треска при състезателните коне, поради способноста му силно да увеличава възможността на тялото да елиминира метаболитни остатъци и токсини от усилената обмяна в клетките.Метилсулфонилметанът (МСМ) е източник на сяра за производството на аминокиселините серин, метионин и серотонин (т.нар. „хормон на щастието”). Сярата участва*

tel.: 0877908513, 0888218847, e-mail: vetsklad@mail.bg

*в синтеза на протеини, в образуването на съединителна тъкан и в катализирането на метаболитни процеси, които превръщат храната в енергия .МСМ играе важна роля за образуването на кератин, колаген, еластин, които осигуряват гъвкавост, тонус и сила на мускулите, костите, ставите, вътрешните мембрани, кожата, гривата и копитата.*
***Хондроитин сулфат -*** *Основното му роля в тялото е свързана със синтез на колаген, който е основен структурен компонент на ставния хрущял и има противовъзпалителни свойства.*
***Глюкозаминът*** *е важен компонент за изграждането на съединителната тъкан и в частност на хрущялите.Изгражда ставните връзки, лигамента, предпазва от развитие на остеоартрит (особено по време на растеж и след травми на ставите и сухожилията ). Той е основната съставна част от синовиалната течност, осигурява мекота и еластичност на ствните връзки. Доказано глюкозаминът има слабо противовъзпалително и болкоуспокояващо действие.*
***Бетаин*** *подпомага храносмилането тъй като подпомага отделянето на стомашни сокове. Бетаинът се използва във ветеринарната медицина като хепатопротектор при коне. Също така бетаина намалява натрупването на излишни телесни мазнини.*

***Карентен период :*** *няма*

***Опаковка:*** *туба 3 литра*

***Срок на годност :*** *до срокът, обозначен на опаковката*

***Съхранение:*** *в тъмни помещения при температура под 25 градуса*

***След употреба не замърсявайте околната среда***

# TETRACICLINA 20%
# SPIRAMICINA 10 %




***Разтворим прах за употреба при кафезни птици и спортни гълъби***

***Състав:*** ***в 1 гр. се съдържат***

| | |
|---|---|
| *Тетрациклин* | *200 мг.* |
| *Спирамицин* | *100 мг.* |
| *Носител* | *до 1 гр.* |

***Показания:***

***TETRASPIR*** *е активен при инфекции с грам-положителни и грам-отрицателни бактерии като Actinobacillus spp., Borditella spp., Campilobacter spp., Pasteurella spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp.* ***TETRASPIR*** *е най-концентрирания и ефикасен медикамент за лекуване на заболявания на дихателната система , стомашно – чревни инфекции и септицемии при птиците.*

***Доза:***

***TETRASPIR*** *се прилага добре разтворен с водата за пиене в количество* ***1 – 2 гр.*** *на* ***1 литър*** *вода в продължение на 5 дни.Дневната доза от антибиотика е най-добре да се раздели на две равни части и да се прилага двукратно през 12 часа.*

***Карентен период :*** *Няма.*

***TETRASPIR*** *не е предназначен за употреба при птици и животни предназначени за консумация от хора.*

***Противопоказания:*** *Да не се комбинира с бактерицидни антибиотици. Да не се прилага по време на активното снасяне.*

***Опаковка :*** *пакет 25 грама*

***Карентен период :*** *няма*

***Срок на годност :*** *до срокът, обозначен на опаковката*

***Съхранение:*** *в тъмни помещения при температура под 25 градуса*

***След употреба не замърсявайте околната среда***

TZAR-05 Ltd.
www.veterinarna-apteka.com

# БИОЦИДИ
# (ДЕЗИНФЕКТАНТИ)

tel.: 0877908513, 0888218847, e-mail: vetsklad@mail.bg

# SANAJOD




## ТЕЧЕН БИОЦИДЕН ПРЕПАРАТ

***Биоцид съдържащ активен йод***

***Състав :***

| | | |
|---|---|---|
| ***Active iodine*** | | ***23 гр.*** |
| ***Phosphoric acid*** | | ***65 гр.*** |
| ***Носител*** | ***до*** | ***1000 мл.*** |

***Действие :***

***SANAJOD*** *е биоцид с бактерицидно (вкл. микобактерициднодействие), вирусоцидно, фунгицидно действие.* ***SANAJOD*** *е с отличен ефект при дезинфекция срещу еймериози (кокцидиоза, изоспороза и др.) и всички яйца и ларви на стомашно-чревни и белодробни паразити.****SANAJOD*** *се отнася към групата на „йодофорите”,т.е. продукт на база „контролиран йод”.Подходящата комбинация на съставките в* ***SANAJOD*** *елиминират корозивното и изгарящо действие на йода, правят го лесно разтворим и лесен за употреба.* ***SANAJOD*** *действа бързо и безопасно, като е необходимо да се осигури достатъчно време за експозиция на дезинфек- ционния разтвор с третираните повърхности съобразно концентрацията на разтвора. Дезинфекцията със* ***SANAJOD*** *не трябва да се извършва при температура над +40 $^{0}$ С,тъй както над този температурен праг, йодът има тенденция да сублимира.* ***SANAJOD*** *не трябва да се смесва със сапуни и алкални продукти, тъй като те отслабват неговото действие.Разтвори на* ***SANAJOD*** *с концентрация 0.05 - 0.1 % се използват за дезинфекция в присъствието на животни.*

***Основни предимства на SANAJOD :***

** Увеличена почистваща сила*

**Доказано бактерицидно,вкл. микобактерицидно (M.avium) , фунгицидно, вирусоцидно, кокцидиоцидно действие и почистващ ефект.*

** Подходящ за почистване и дезинфекция на повърхности и оборудване във ветеринарни обекти,вкл.обекти за събиране,отглеждане,настаняване и транспортиране на животни*

**За професионална и масова употреба*

tel.: 0877908513, 0888218847, e-mail: vetsklad@mail.bg

***Доза и инструкции за употреба :***

***SANAJOD*** *се прилага под формата на водни работни разтвори с концентрации* ***0.05 - 3.0 %.*** *Дезинфекцията се извършва чрез напръскване, забърсване или машинно почистване и дезинфекция на предварително почистените помещения и повърхности с :*

** **1.75 %** работен разтвор на **SANAJOD** с бактерицидно действие, експозиция 30 минути*

** **3.0 %** работен разтвор на **SANAJOD** с **микобактерицидно** действие (M.avium), експозиция 60 минути*

** **1.0 %** работен разтвор на **SANAJOD** с **фунгицидно** действие, експозиция 30 минути*

** **1.0 %** работен разтвор на **SANAJOD** с **вирусоцидно** действие, експозиция 60 минути*

** **2.0 %** работен разтвор на **SANAJOD** с **вирусоцидно** действие, експозиция 15 минути*

** **0.05%** работен разтвор на **SANAJOD** за дезинфекция на замърсена вода*

** **0.5 – 1.0 %** работен разтвор на **SANAJOD** за дезинфекция на ферми, кланици, инкубатори, доилни помещения, оборудване, превозни средства за животни, обществени тоалетни, контейнери за отпадъци, вагони*

** **дезинфекция за намаляване на бактериалната контаминация в присъствието на животни:***

- *профилактично **0.2 %** работен разтвор на **SANAJOD***
- *в случай на инфекция **0.5 %** работен разтвор на **SANAJOD***

** **0.05%** работен разтвор на **SANAJOD** за дезинфекция на питейна вода за животни*

** **0.1 – 0.15 %** работен разтвор на **SANAJOD** за дезинфекция на стъклени съдове във винената и млечна промишленост, в болници и лаборатории*

** **0.5 %** работен разтвор на **SANAJOD** за дезинфекция на хирургични инструменти, празни басейни*

** **1.0 %** работен разтвор на **SANAJOD** за дезинфекция на постелята ( **особено при бройлери и патици за гушене**) , преди населването на помещенията*

***Разходна норма на работните разтвори :*** *за гладки повърхности :100 – 150 мл /м$^2$*

*за порьозни повърхности : 180 – 200 мл /м$^2$*

***Да се осигури добро проветряване на обработените помещения.***

***Карентен период :*** *няма*
***Опаковка:*** *туба 5 литра ; бутилка 1 литър*
***Срок на годност :*** *до срокът, обозначен на опаковката*
***Съхранение:*** *в тъмни помещения при температура под 25 градуса*
***След употреба не замърсявайте околната среда***

tel.: 0877908513, 0888218847, e-mail: vetsklad@mail.bg

**TZAR-05 Ltd.**
www.veterinarna-apteka.com




# GLUTARSAN

## ТЕЧЕН БИОЦИДЕН ПРЕПАРАТ

***Широкоспектърен биоцид на база глутаралдехид и четвъртични амониеви съединения ,успешна комбинация за абсолютна дезинфекция***

***Състав :***

| | |
|---|---|
| ***Glutaraldehyde*** | ***100 гр.*** |
| ***Benzalkonium chloride*** | ***200 гр.*** |
| ***Носител*** | ***до 1000 мл.*** |

***Действие :***

*Благодарение на двукомпонентния си състав,* ***GLUTARSAN*** *е биоциден препарат с двойно действие:* ***Бензалкониевия хлорид*** *( средство за санитарна обработка) от една страна въздейства върху патогенния организъм лизирайки клетъчната му стена , а от друга върху заобикалящата среда , като обезмаслява, почиства и дезодорира.****Глутаралдехида*** *(неутрализиращо средство) е компонента с бактерицидно , вирусоцидно и фунгицидно (вкл. спорообразуващи) действие. ,* ***GLUTARSAN*** *е стабилен при температурни промени, не се влияе от pH на средата, не е корозивен, има висока биоразгра – димост и след дезинфекцията не оставя петна.Бактерицидното действие на* ***GLUTARSAN*** *е незабавно, а бактериостатичното действие при санитарна обработка е продължител- но при концентрация на разтвора 0.1 % - 0.5 %.При дезинфекция с* ***GLUTARSAN*** *без отмиване, той образува бактериостатичен слой по третираните повърхности, който пречи за развитието на микроорганизмите.*

***Основни предимства на GLUTARSAN:***

**Увеличена почистваща сила*

**Доказан бактерициден , фунгициден и вирусоциден ефект*

** Подходящ за почистване на повърхности и оборудване,които са в контакт с храни*

**Използва се във всички обекти за производство и търговия с храни, в здравни и лечебни заведения , индустриални обекти, ветеринарни хирургии и лечебници, животновъдни ферми, транспортни средства, люпилни и инкубатори, канализационни тръби, дезинфекционни площадки за превозни средства*

**tel.: 0877908513, 0888218847, e-mail: vetsklad@mail.bg**

**За професионална и масова употреба*

***Доза и инструкции за употреба :***

*Преди да се извърши дезинфекцията, помещенията и всички повърхности да се почистят механично.* ***GLUTARSAN*** *се прилага под формата на водни работни разтвори с концентрации* ***0.5 % - 2.0 %****, чрез напръскване или забърсване с парцал или гъба.*

** **0.5 % - 1.0 %** работен разтвор на* ***GLUTARSAN*** *за ветеринарни обекти,ферми, люпилни и инкубатори при време за действие 30 минути с бактерицидно , вирусоцидно и фунгицидно действие.*

** **2.0 %** работен разтвор на* ***GLUTARSAN*** *с действие срещу микобактерии (M.avium)*

** **0.1% - 0.5 %** работен разтвор на* ***GLUTARSAN*** *за санитарна обработка*

** **0.5 %** работен разтвор на* ***GLUTARSAN*** *за забърсване на слабо замърсени повърхности: хладилници, хладилни витрини,плотове и др.,при добро изплакване или изпиране на парчето плат, преди всяко отриване, експозиция 30 – 60 минути. Третираните повърхности се забърсват с мокра кърпа.*

****почистване от мазнини и варовикови отлагания по повърхности , производствени съоръжения и инсталации с по следваща дезинфекция:***

*При мазни повърхности :*

*Мазните повърхности се напръскват с* ***0.5 -1.0 %*** *воден разтвор на* ***GLUTARSAN*** *.След нанасянето се осигурява време за действие от 20 – 30 минути, за да може разтвора да реагира с мазнините , след което се изплаква обилно с питейна вода .*

*За премахване на варовикови отлагания:*

*Повърхностите се напръскват с* ***1.0 %*** *воден разтвор на* ***GLUTARSAN****. След нанасянето се осигурява време за действие от 20 - 30 минути,за да може разтвора да реагира с варовиковите отлагания , след което се изплаква обилно с питейна вода .*

****Почистване и дезинфекция на моторни превозни средства***

*Извършва се дезинфекция чрез еднократно напръскване с* ***1.0 %*** *воден разтвор на* ***GLUTARSAN*** *с време за експозиция 30 – 60 минути.Превозните средства се използват след изсъхване.*

***Да се осигури добро проветряване на обработените помещения.***

***Карентен период :*** *няма*

***Опаковка:*** *туба 5 литра ; бутилка 1 литър*

***Срок на годност :*** *до срокът, обозначен на опаковката*

***Съхранение:*** *в тъмни помещения при температура под 25 градуса*

***След употреба не замърсявайте околната среда***

**tel.: 0877908513, 0888218847, e-mail: vetsklad@mail.bg**

# QUATERSAN




## УНИВЕРАСАЛЕН ТЕЧЕН

## БИОЦИДЕН ПРЕПАРАТ

***Биоцид на база***
***четвъртични амониеви съединения***

***Състав :***

| | |
|---|---|
| ***Alkyl – totyl – methyl – ammonium chloride*** | ***200 гр.*** |
| ***Носител до*** | ***1000 мл.*** |

***Действие :***

***QUATERSAN*** *е биоцид активен срещу вируси, бактерии, дрожди, гъбички (включително дерматофити).* ***QUATERSAN*** *има силна проникваща способност (****съдържа ПАВ, които намаляват повърхностното напрежение****) и е подходящ за почистване и дезинфекция на всякакви повърхности.Поради ниската си токсичност,* ***QUATERSAN*** *е безопасен за работа, не е корозивен, не цапа и не уврежда метални части, гумени уплътнения, пластмаси, боядисани повърхности и др.* ***QUATERSAN*** *има много добър дезодориращ ефект, тъй като има подчертана активност срещу бактерии предизвикващи гниене и ферментация.* ***QUATERSAN*** *се използва за дезинфекция и предотвратяване на растежа на зелени водорасли и гъбички в плувни басейни, шадравани и в съдове за съхранение на вода.*

***Основни предимства на QUATERSAN :***

**Увеличена почистваща сила*
**Доказана ефикасност срещу бактерии и гъбички и вируси*
** Подходящ за почистване на повърхности и оборудване, които са в контакт с храни за хора и животни*
**Отстранява мазнини и варовити отлагания по дезинфекцираните повърхности*
**Неутрално pH*
**Използва се във всички обекти за производство и търговия с храни, в здравни и лечебни заведения, ветеринарни обекти,вкл. обекти за отглеждане на животни и транспортни средства.*
**За професионална и масова употреба*
** Продължителния контакт с третираните повърхности, увеличава остатъчната активност чрез образуване на бактериостатичен „филм" върху тях.*

***Области на приложение на QUATERSAN:***

**за почистване и дезинфекция в здравни и лечебни заведения*

**за почистване и дезинфекция на предприятия и оборудване в хранително-вкусовата промишленост (кланици, месопреработвателни предприятия, мандри, сладкарски цехове, заведения за хранене и др.)*

**за почистване и дезинфекция на обекти за търговия с храни*

**за почистване и дезинфекция в обекти с обществено предназначение*

**за почистване и дезинфекция във ветеринарни обекти, вкл. обекти за отглеждане на животни*

**за почистване и дезинфекция на транспортни средства за хранителни продукти, фуражи и животни*

**за почистване и дезинфекция на басейни и водата в тях при пълнене*

**за почистване и дезинфекция на тръби за питейна вода от водорасли*

**за почистване и дезинфекция на яйца, люпилни, люпилни стаи и оборудване*

***Доза и инструкции за употреба :***

***QUATERSAN*** *се прилага под формата на водни работни разтвори с концентрации* ***0.5 %-1.5 %.*** *Дезинфекцията се извършва чрез напръскване или забърсване на предварително почистените повърхности с :*

****почистване от мазнини и варовикови отлагания на повърхности , плотове,хладилници,хладилни витрини и др. в търговски обекти и производствени помещения и инсталации с по-следваща дезинфекция :***

*<u>При мазни повърхности :</u>*
*Мазните повърхности се напръскват с* ***1.0 % -1.5 %*** *воден разтвор на* ***QUATERSAN****.След нанасянето се осигурява време за действие от 20 – 30 минути,за да може разтвора да реагира с мазнините , след което се изплаква обилно с питейна вода .*

*<u>За премахване на варовикови отлагания:</u>*
*Повърхностите се напръскват с* ***1.5 %*** *воден разтвор на* ***QUATERSAN****. След нанасянето се осигурява време за действие от 20 - 30 минути,за да може разтвора да реагира с варовиковите отлагания , след което се изплаква обилно с питейна вода .*

*<u>Крайна дезинфекция :</u>*
*Повърхностите се напръскват с* ***0.05 %*** *воден разтвор на* ***QUATERSAN*** *без да се изплакват.*

**** почистване и дезинфекция на слабо замърсени повърхности, плотове,хладилници,хладилни витрини и др. в търговски обекти и производствени помещения.***

*Еднократно забърсване на повърхностите с* ***0.5 %*** *воден разтвор на* ***QUATERSAN*** *, при добро изплакване или изпиране на парчето плат,преди всяко отриване в съд с топла вода.Времето за експозиция е 30 – 60 минути.*

**** почистване и дезинфекция на моторни превозни средства***
*Извършва се дезинфекция чрез еднократно напръскване с* ***0.5 % - 1.0 %*** *воден разтвор на* ***QUATERSAN*** *с време за експозиция 30 – 60 минути.*

**** 0.5 % -1.0 % работен разтвор на QUATERSAN*** */по високите концентрации може да са необходими при случаи на големи замърсявания със силен фунгициден ефект/.Използва се пръскачка или парострyйка с ниско налягане,за да се напръскат с разтвор всички повърхности с разходна норма за гладки повърхности 100 – 150 мл/м$^2$ , за порьозни повърхности 180 – 200 мл/м$^2$.Времето за експозиция е 15 - 20 минути,след което всички третирани повърхности се изплакват обилно с питейна вода.*

**** 1.5 % разтвор на QUATERSAN за ветеринарни обекти*** *при време за действие 30 минути с бактерицидно и фунгицидно действие.*

**** 0.5 % работен разтвор на QUATERSAN за забърсване на слабо замърсени повърхности****: хладилници, хладилни витрини,плотове и др.,при добро изплакване или изпиране на парчето плат,преди всяко отриване, експозиция 30 – 60 минути.*

**** 0.4 % работен разтвор на QUATERSAN за потапяне на яйцата*** *преди залагането им за инкубация*

**** 1.5 % работен разтвор на QUATERSAN за люпилни, люпилни стаи и оборудване***

**** 0.5 % работен разтвор на QUATERSAN*** *за дезинфекция на празни* ***басейни****.Тръбите захранващи басейна се почистват и дезинфекцират с 0.5 % разтвор на* ***QUATERSAN*** *,като се оставят напълнени за 1 час,след което се изплакват обилно с вода.За дезинфекция на водата при пълнене на басейна,* ***QUATERSAN*** *се прилага в доза 10 мл. на 1000 литра вода.*

***Разходна норма на работните разтвори :*** *за гладки повърхности :100 – 150 мл /м$^2$*

*за порьозни повърхности : 180 – 200 мл /м$^2$*

***ПЧЛНИ СЕМЕЙСТВА :***

**** За третиране на пчелни семейства срещу „Варовито пило“и „Аспергилоза“*** ***QUATERSAN*** *се прилага в доза* ***0.5 мл. на 1 л.*** *захарен сироп, два пъти през 3-5 дни.Препоръчително е с част от медикаментозния сироп да се опръска върху засегнатите части по пчелните пити.*

**** За дезинфекция на пчеларски инвентар – 0.5 – 1.0 %*** *на* ***QUATERSAN .*** *Инвентара се потапя за 30-60 мин., след което се изплаква.*

***Да се осигури добро проветряване на обработените помещения.***

***Карентен период :*** *няма*

***Опаковка:*** *туба 5 литра ; бутилка 1 литър*

***Срок на годност :*** *до срокът, обозначен на опаковката*

***Съхранение:*** *в тъмни помещения при температура под 25 градуса*

***След употреба не замърсявайте околната среда***

**tel.: 0877908513, 0888218847, e-mail: vetsklad@mail.bg**